




Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS) Public Health Bulletin: Emerging Nitazenes Trend July 2024

ស្រ្ទីមទិន្នន័យការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំរដ្ឋ Massachusetts (MADDS)
ព្រឹត្តិបត្រសុខភាពសាធារណៈ៖ និន្នាការ Nitazenes ដែលកំពុងរីកចម្រើន - ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024

ថ្មីៗនេះ សំណាកថ្នាំជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកនូវសារធាតុនីតាហ្សេន រួមទាំងប្រូតូនីតាហ្សេន អ៊ីសូតូនីតាហ្សេន និងមេតូនីតាហ្សេន។ Nitazenes គឺជាប្រភេទអាភៀនសំយោគមួយ។ សារធាតុមួយចំនួនមានកម្លាំងទាបជាង fentanyl ក្នុងពេលដែលមួយចំនួនទៀត អាចមានកម្លាំងខ្លាំងជាង 40 ដង។ ថ្នាំទាំងនេះជួនកាលត្រូវបានដាក់លាយជាមួយថ្នាំ dope, fentanyl និងហ្សែអ៊ីន។ វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការស្វែងរកនីតាហ្សេនច្រើនជាងមួយនៅក្នុងកំរិតមួយ ដូចជាអ៊ីសូតូនីតាហ្សេនជាមួយមេតូនីតាហ្សេន ឬមេតូនីតាហ្សេនជាមួយ ប្រូតូនីតាហ្សេន។ ពួកគេក៏ត្រូវបានគេរកឃើញជាញឹកញាប់លាយជាមួយ fentanyl និង xylazine ។ ចំនួនសំណាកដែលធ្វើតេស្តដោយ MADDS បានរកឃើញថាមានសារធាតុ នីតាហ្សេនគឺ 6 ក្នុងឆ្នាំ 2023 និង 17 ចាប់ពីខែមករាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 (រកឃើញដោយមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងបរិមាណដាន)។

Nitazenes ដោយការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ដោយផ្អែកលើខោនធីនៃ ប្រភពដើមកំរិតសង្គម



Nitazenes គឺជាក្រុមនៃថ្នាំសំយោគខ្លាំង។ វាអាចខ្លាំងជាង fentanyl ដែលមានន័យថា ពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសូម្បីតែក្នុង បរិមាណតិចតួចក៏ដោយ។

Nitazenes ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងថ្នាំខុសច្បាប់ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យ ដោយសារមនុស្សប្រហែលជាមិនដឹងថាពួកគេកំពុងលេបថ្នាំទាំងនោះ។ ផែនទីនេះបង្ហាញពីកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ដែលយើងបានឃើញ nitazenes នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំនាពេលថ្មីៗនេះ។

Naloxone អាចសង្គ្រោះជីវិតក្នុងពេលប្រើប្រាស់ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ កម្រិតបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹង nitazene ។ តែងតែទូរស័ព្ទទៅលេខ 911។

ផែនទីដែលបង្ហាញពីផ្អែកលើទិន្នន័យ StreetCheck ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2023 ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024

ទិន្នន័យគ្លីនិកស្តីពីថ្នាំ nitazene ត្រូវបានកំណត់ ដោយសារថ្នាំទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេត្រូវបានរំពឹងថានឹងបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអាក្រក់ធម្មតា និងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការប្រើប្រាស់។ អ្នកដែលប្រើ nitazenes អាចបង្កើតភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះថ្នាំអាភៀន ហើយមានរោគសញ្ញាដកចេញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងលឿនជាង។ មនុស្សពាណិជ្ជកម្មនីតាហ្សេនថាជា "ពិបាកដក់បារី" ដោយចំហាយទឹកមានពណ៌លឿង។ អ្នកដែលប្រើថ្នាំនីតាហ្សេនក៏រាយការណ៍អំពីការឡើងកន្ទួល ឮសូរហ៊ឹងត្រចៀក ការហៀរសំបោរ និងមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំដែលមានផ្ទុកនីតាហ្សេន។

Naloxone (Narcan) អាចព្យាបាលការប្រើប្រាស់កម្រិតដែលទាក់ទងនឹងនីតាហ្សេន ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាត្រូវប្រើកម្រិតបន្ថែមទៀត និងជួយសង្គ្រោះការដកដង្ហើមឱ្យបានយូរព្រោះនីតាហ្សេនមានកម្លាំងខ្លាំង។ រង់ចាំ 2-3 នាទីរវាងដូសនីមួយៗនៃ naloxone ហើយផ្តល់ដង្ហើមសង្គ្រោះនៅចន្លោះ។ តែងតែទូរស័ព្ទទៅលេខ 911។ naloxone ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ (មាន > 4mg នៃ naloxone ក្នុងមួយឯកតា) មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ វាជាការប្រសើរក្នុងការផ្តល់ naloxone ក្នុងកម្រិតតូចជាង ហើយម្តងទៀតប្រសិនបើចាំបាច់។ មិនមានភស្តុតាងដែលថា nitazene មានភាពធន់នឹង naloxone ទេ។

* គំរូទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ដោយកម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ឬបរិច្ចាគដោយនាយកដ្ឋានប៉ូលីសសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត MADDS ។
MADDS គឺជាគំរូសហការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Brandeis នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ Massachusetts នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងផ្សេងៗ និងភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់។ សូមទាក់ទងនឹងយើងនៅ maddsbrandeis@gmail.com.

នៅរដ្ឋ Massachusetts យើងបានឃើញ nitazenes មានចាប់ពីកម្លាំងតិចជាង fentanyl រហូតដល់ 25 ដងខ្លាំងជាង fentanyl ។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញថាតើប្រភេទ nitazene ខុសគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹង fentanyl ។ រួម បញ្ចូល តែ nitazenes ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកំរងថ្នាំដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ប៉ុន្តែមានប្រភេទ nitazenes ផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅទីនេះ។

ប្រភេទនៃ Nitazene៖	កម្លាំងបានប្រៀបទៅនឹង Fentanyl៖
Metodesnitazene	ខ្សោយជាង fentanyl
Metonitazene	មានកម្លាំងស្រដៀងគ្នាទៅនឹង fentanyl
Lsotonitazene	មានកម្លាំង 5 ដងច្រើនជាង fentanyl
Protonitazene	មានកម្លាំង 5 ដងច្រើនជាង fentanyl
Etonitazene	មានកម្លាំង 10 ដងច្រើនជាង fentanyl
N-Pyrrolidino Protonitazene	មានកម្លាំង 25 ដងច្រើនជាង fentanyl

*ខណៈពេលដែលនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នោះ nitazenes អាចខ្លាំងជាង fentanyl រហូតដល់ 40 ដង។ ទោះបីជានៅក្នុងបរិមាណដាន nitazene អាចខ្លាំងក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់ពិតជាអាស្រ័យលើការផ្តោតអារម្មណ៍ និងកម្រិតថ្នាំ។


ចំណុចសំខាន់ចំពោះការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Nitazenes៖

- ចាប់ផ្តើមកម្រិតទាប និងយឺតនៅពេលប្រើថ្នាំដែលអាចមានផ្ទុកសារធាតុនីកាហ្វេន
- ប្រើជាមួយអ្នកដទៃបើអាចធ្វើទៅបាន ដូច្នេះមាននរណាម្នាក់នៅទីនោះដើម្បីឆ្លើយតបនៅក្នុងករណីនៃការប្រើប្រាស់
- ប្រសិនបើប្រើតែម្នាក់ឯង ពិចារណាការហៅទៅកាន់ Safe Spot តាមរយៈលេខ 1-800-972-0590 នោះ នរណាម្នាក់ នឹងនៅទូរស័ព្ទជាមួយអ្នក ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអាចហៅទូរសព្ទទៅកាន់ជំនួយក្នុងករណីប្រើថ្នាំប្រុង។
- កាន់ naloxone (Narcan) ជាប់នឹងខ្លួន
- អាចត្រូវការកម្រិតបន្ថែមនៃ naloxone រង់ចាំ 2-3 នាទីរវាងកម្រិតថ្នាំ naloxone ផ្តល់ដង្ហើមសង្គ្រោះនៅចន្លោះហើយហៅទៅលេខ 911
- ផលិតផល naloxone កម្រិតខ្ពស់ដែលមាន > 4mg នៃ naloxone ក្នុងមួយឯកតាមិនត្រូវបានណែនាំទេ។
- ធ្វើតេស្តថ្នាំមុនពេលប្រើ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន សម្រាប់ការធ្វើផែនការសុវត្ថិភាពដែលមានព័ត៌មានប្រសើរជាងមុន។

Nitazenes អាចពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅលើឧបករណ៍ ដែលប្រើសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនតាមសហគមន៍។ ក្នុងចំណោមសំណាកវិជ្ជមាន nitazene ដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយការត្រួតពិនិត្យថ្នាំតាមសហគមន៍ យើងបានរកឃើញថា protonitazene ទំនងជាត្រូវបានរកឃើញបំផុត។ បន្ទះតេស្ត Nitazene មាន ប៉ុន្តែជាបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងលេចចេញ ដែលត្រូវការការធ្វើតេស្តបន្ថែម ហើយមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចទុកចិត្តបាននៅឡើយ។ បន្ទះតេស្ត Fentanyl និងបន្ទះតេស្ត xylazine មិនអាចរកឃើញ nitazenes នៅក្នុងសារធាតុបានទេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងដៃគូរបស់ MADDS និងសេវាពិនិត្យថ្នាំតាមសហគមន៍ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សូមចូលទៅកាន់ [StreetCheck.org/find-drug-checking-services](https://www.streetcheck.org/find-drug-checking-services) ឬស្កេនកូដ QR ខាងក្រោម។

ស្កេនកូដ QR
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកន្លែងដែលត្រូវ
ស្វែងរកសេវាពិនិត្យថ្នាំនៅរដ្ឋ
Massachusetts
និងសហរដ្ឋជុំវិញ



ការពិនិត្យមើលថ្នាំ
ការត្រួតពិនិត្យសហគម
DRUO